

Aktuelle Studien ab 2010 im Tempelhofer Darmzentrum TeDaZett

Studie	Indikation	Infos
Schlag-Studie	Prospektive randomisierte Vergleichsstudie zur präoperativen Kurzzeit-Radiotherapie versus Langzeit-Radiochemotherapie beim uT2-3 Rektumcarcinom	6 Patienten mit follow-up Daten Studie seit 2009 beendet
Avastin	Avastin -First line beim metastasierten kolorektalem Karzinom	Beginn 15.02.2010
Synchronous Studie	Resektion versus Nichtresektion vor systemische Chemotherapie beim metastasierten Kolonkarzinom	in Vorbereitung
PROUD-Trial	Prevention of abdominal wound infection – PROUD-Trial Gegenüberstellung PDS II plus coated mit Triclosan und PDS II (Nahtgutmaterial)	Beginn 24.01.2011
Optimult-Studie	Eine geplante randomisierte zweiarmige Studie mit Patienten, deren Rektumkarzinom 2 mm oder mehr Abstand vom zirkumferenziellen Resektionsrand im MRT aufweist. Diese werden entweder primär operiert (Interventionsarm) oder neoadjuvant radiochemotherapiert mit anschließender Chirurgie (Kontrollarm).	geplant
1.Multizenterstudie	Prospektive,randomisierte und kontrollierte Multizenterstudie zur Evaluation zweier verschiedener Verschlusszeitpunkte der protektiven Ileostomie nach Rektumresektion	geplant
2.Multizenterstudie	Randomisierter Vergleich zweier verschiedener Längen des ableitenden Schenkels des queren Koloplastik-Pouches nach tiefer anteriorer bzw. intersphinktären Rektumresektion mit totaler mesorektaler Exzision	geplant