

Information zur Vorbereitung auf eine Koloskopie



Darmspiegelung mit Moviprep®

Liebe Patientin, lieber Patient,

damit Sie gut vorbereitet zur Darmspiegelung gehen, ist es wichtig, den Darm zuvor gründlich zu reinigen. Dieses Merkblatt enthält entscheidende Informationen zur Vor- und Nachbereitung sowie zur Untersuchung selbst.

Bei weiterem Klärungsbedarf hilft Ihnen unser Endoskopie-Team

Montag–Freitag 8–15 Uhr unter 030 7882-2108

Können Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen, sagen Sie ihn bitte frühzeitig ab, spätestens jedoch am Vortag.

Vorbereitung

Für eine schnelle und problemlose Koloskopie brauchen wir Ihre Unterstützung. Der Erfolg der Untersuchung hängt insbesondere von der Qualität der Darmreinigung ab. Bitte beherzigen Sie in der Woche vor Ihrem Termin Folgendes:

7 Tage vor der Untersuchung

- | Eisenpräparate absetzen
- | Blutverdünner wie *Marcumar* müssen unter Umständen 5–7 Tage vorher abgesetzt werden. Ob eine überbrückende Behandlung mit Heparinspritzen notwendig ist, sprechen Sie bitte mit Ihrer Hausärztin / Ihrem Hausarzt ab. ASS darf in der Regel weiter eingenommen werden.

5 Tage vor der Untersuchung

- | Blähende Nahrungsmittel wie Hülsenfrüchte, fettreiche Kost, Müsli oder Körnerbrot meiden.
- | Obst und Gemüse mit kleinen Kernen und harter Schale bitte ebenfalls meiden. Kiwis, Trauben, Johannisbeeren, Erdbeeren, Melonen oder Tomaten, Paprika, Mais sind schwer verdaulich, können Endoskope verstopfen und das Untersuchungsergebnis beeinträchtigen.
- | Bei Diabetes ist die Medikamenteneinnahme (Insulin, Tabletten) mit der behandelnden Ärztin / dem behandelnden Arzt abzustimmen.
- | Weitere Medikamente wie etwa Blutdruck- oder Hormonpräparate sind in den folgenden Tagen erlaubt.

Vortag der Untersuchung

Morgens

Lösen Sie den Inhalt der beiden Moviprep®-Beutel – getrennt voneinander – in je 1 Liter lauwarmem Wasser auf. Bitte beide Lösungen kalt stellen.

Frühstück

Kaffee oder Tee, Toast mit Honig oder Gelee sind geeignet.

12 Uhr

Bitte nehmen Sie nur eine klare Brühe ein.

WICHTIG Nach 12 Uhr nichts mehr essen.



15 Uhr

Nun den 1. Liter der vorbereiteten Moviprep®-Lösung glasweise und innerhalb einer Stunde trinken. Anschließend sollten Sie unbedingt weiterhin klare Flüssigkeit zu sich nehmen (Tee, stilles Wasser, klarer Apfelsaft).

- | Ungefähr 30 Minuten nach dem ersten Glas werden Sie den ersten Stuhl drang verspüren. Bleiben Sie in der Nähe einer Toilette.
- | Nach den Abführmaßnahmen sollte der Stuhl gelb und klar sein sowie keine festen Bestandteile mehr enthalten.
- | Der 2. Liter Moviprep®-Lösung verbleibt im Kühlschrank.

Untersuchungstag

WICHTIG Heute vor der Untersuchung nichts mehr essen.

Morgens

Spätestens drei Stunden vor Ihrem Termin trinken Sie bitte den zweiten Liter Moviprep®-Lösung innerhalb von 30 Minuten.

Bis zu zwei Stunden vor der Untersuchung: Trinken Sie viel klare Flüssigkeit wie z. B. Tee und stilles Wasser.

WICHTIG Zwei Stunden vor der Untersuchung nichts mehr trinken.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie am Untersuchungstag keinen Schmuck und mindestens an einem Finger keinen Nagellack oder künstlichen Fingernagel tragen.

Für den Aufenthalt in der Endoskopie planen Sie bitte ca. drei Stunden ein.

Bitte unbedingt mitbringen

- | Gültige Versicherungskarte und Überweisungsschein
- | Relevante Arztberichte, Laborwerte und Vorbefunde
- | Unterschriebene und datierte (spätestens einen Tag vor dem Termin) Einverständniserklärung
- | Aufklärungsbogen: *Information zur Sedierung*

Nach der Untersuchung

Zur Stärkung nach der Untersuchung bringen Sie sich gerne etwas zu Essen mit (z. B. Zwieback, Plätzchen, belegtes Brot). Getränke werden angeboten.

Zuhause

Bei Blut im Stuhl, Schmerzen oder Erbrechen melden Sie sich bitte umgehend in unserer **Ersten Hilfe 030 7882-2727**.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Ihr Endoskopie-Team